· 234 ·
第 35卷第 5期
2013年 9 月
贵阳中医学院学报
JGCTCM
No．5 Vo1．35
September 2013
反应中的应用 [J]，长江大学学报 (自然科学版)医学卷，
2010，18(3)：140—141．
[4] 吴亚敏，张丽萍，万琼红 ．舒适护理在膀胱灌注化疗中的应
用 [J]．中国校医，2012，26(5)：392．
5] 汪向东，王希林，马弘 ．心理卫生评定量表手册 (增订版)
[M]．中国心理卫生杂志社，1999，12：194—197；235—237．
[6] 颜桂兰，李国祥，苟欣，等 ．优质护理在微创治疗胆总管结石
中的应用 [J]．护士进修杂志，2012，27(3)：281—282．
[7] 季玉秀 ．对晚期胃癌患者实施优质护理服务的效果研究
[J]．吉林医学，2012，33(30)：6655．
千玉洁抗菌洗液在护理会阴侧切伤口中的应用观察
和振芬
(冀中能源峰峰集团邯郸医院，河北邯郸 056002)
摘要：目的：观察千玉洁抗菌洗液在护理会阴侧伤伤口中的疗效观察。方法：收集接受治疗的 182例行会阴侧切术的
患者，作为研究对象，随机将 182例患者分为时照组及观察组两组，每组 91例患者，对照组患者给予常规护理外，加用碘伏
擦洗伤 12；观察组在对照组基础上加用千玉洁抗茵洗液清洗伤 1：2，两组患者均每日两次。比较两组患者的伤 12愈合情况
及拆线时间。伤 12肿胀情况。结果：两组经治疗后，显示观察组的切 12愈合情况显著优于对照组，消肿所需时间明显缩短于
对照组，观察组平均拆线时间 3．23d，对照组为 4．54d。结论：会阴侧切伤口加用千玉洁清洗液清洗后，可促进伤 12愈合，缩
短伤口拆线平均时间，加快伤口肿胀的消退。
关键词：千玉洁；会阴侧切；伤口；效果
Doi：10．3969／j．issn．1002—1108．2013．05．0125
中图分类号：R473．71 文献标识码：B 文章编号：1002—1108(2013)05—0234—02
在自然分娩过程中，初产患者，头位分娩时会阴部较
再产者紧，局部组织硬，或者是发育不良等情况时，预计自
然分娩时会出现 Ⅱ度以上的裂伤，为有效预防新生儿头颅
受到过度挤压而出现新生儿颅内出血，避免危急情况的出
现，常采用会阴侧切术，目前该术已趋于常规使用]。笔
者为探讨千玉洁洗液在会阴侧切伤口护理中的作用，设定
本次研究，观察患者在使用千玉洁清洗后，对伤口愈合情
况，拆线时间，伤口肿胀情况等的影响，现报告如下。
1 资料及方法
1．1 一般资料病例均来源于 2012年 04月 ～2013年 o4
月间在我院行会阴侧切伤口的 182例，其中：初产妇 176
例，经产妇 6例；年龄 24～39岁。所有患者均无心血管等
病史。将 182例患者随机分为对照组及观察组，每组各 91
例。两组患者在年龄等资料无统计学差异 (P>0．05)，具
有可比性。
1．2 消毒方法对照组患者，在术后给予碘伏消毒，2次／
d。实验组，在碘伏处理基础上加用千玉洁清洗伤口处，2
次／d，在患者排便后加用一次。
1．3 观察指标
1．3．1 会阴切口愈合情况甲级愈合：伤口愈合良好，无
明显红肿，感染征象；乙级愈合：会阴伤口局部有红肿、线
头炎，但皮肤完整无溃破；丙级愈合：伤口处有脓液分泌，
修回日期：2013—04—25
伤口裂开。
1．3．2 会阴侧切伤口肿胀程度的评价标准根据肿胀直
径的大小大致分为三个等级，轻度：肿胀围绕切口缘，大小
<0．05cm；中度：切口周缘肿胀，肿胀直径在 0．5cm至 lcm
之间；重度：肿胀直径在 >1cm。
2 结果
2．1 患者伤口愈合及拆线时间比较两组患者在治疗
后，观察患者伤口愈合情况，并记录各患者拆线时间，结果
显示，对照组甲级伤口愈合率 86．8％，显著低于观察组的
94．5％ ，在应用千玉洁清洗液清洗后，观察组的患者需要
3．23d拆线，明显短于对照组的 4．54d。
2．2 治疗后会阴侧切伤口肿胀情况比较两组患者在治
疗后，术后第 1、3、4d，出现伤口处轻度肿胀的人数，观察组
分别为 76、34、10，对照组为 83、57、34，结果比较可见观察
组患者肿胀情况显著优于对照组。
3 小结
会阴侧切术是妇女生产时常用的方法，其包括侧切和
中切，目的是为了防止产妇会阴撕裂伤，保护盆底肌肉。
该手术主要适用于初产妇会阴肌肉紧张、生理结构长、组
织硬或伴有炎症水肿等病理改变时，可预防出现 Ⅱ度以上
的裂伤。该术操作简单，一般预后较好，临床偶可见感
染的出现，引起感染的常见原因有：(1)细菌及真菌的感

第35卷 第5期
2013年9月

贵阳中医学院学报

JGCTCM

No．5 Vo1．35

September 2013 ·235 ·

染，产前产妇即有感染的存在，